

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 95-10 et 97-11, Postes 260 et 263)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5503-17

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément n° 2 au Bulletin n° 19 d'Avril 1962.

A V E R T I S S E M E N T . -

A R B R E S F R U I T I E R S

TAVELURES. - Les dernières pluies, parfois importantes, ont permis les premières contaminations par ascospores, sur Poiriers ainsi que sur Pommiers ayant atteint ou dépassé le stade C 3. Sur Poiriers et sur ces Pommiers, nous conseillons d'effectuer un nouveau traitement afin d'assurer la continuité de la protection.

Les Pommiers non encore intéressés devront être traités dès que sera atteint le stade C 3 (comme nous l'avons indiqué dans notre note précédente : vu l'état de maturité des périthèces, des attaques graves seront alors à redouter).

I N F O R M A T I O N S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

CHENILLES DEFOLIATRICES. - On peut observer localement de très fortes attaques de Chenilles défoliatrices sur Pommiers. Dans les vergers intéressés, intervenir immédiatement.

PUCERONS - OIDIUM. - Ne pas négliger la lutte contre ces parasites. Intervenir s'il y a lieu.

XYLEBORE. - Les dégâts causés par cet insecte qui se signale par la présence de nombreux petits trous sur le tronc et les branches charpentières sont graves par endroits, sur Pommiers, Abricotiers et Pêchers.

Par beau temps (températures atteignant une vingtaine de degrés), effectuer un traitement copieux.

Utiliser, à forte concentration, un produit à base de D.D.T., d'H.C.H., de Lindane, de Dieldrine ou de Parathion (Olléoparathion).

HOPLOCAMPES. - (Poiriers et Pruniers).

Dans les vergers où ces insectes causent des dégâts (jeunes fruits rongés à l'intérieur par un ver qui a une forte odeur de punaise), il est rappelé qu'un traitement soigné doit être effectué pendant la chute des pétales (début défloraison pour le Poirier, 3/4 chute des pétales pour le Prunier).

Pour les produits à utiliser, consulter la liste (Edition Spéciale) qui vous a été adressée.

V I G N E

VERS GRIS. - (Noctuelles)

Les chenilles dévorent, pendant la nuit, les bourgeons peu après leur débourrement.

En cas d'attaques - fréquentes par endroits certaines années - effectuer des pulvérisations sur les bourgeons avec un produit à base de D.D.T. à forte dose, ou mieux, placer le soir au pied des ceps, des appâts de son additionné d'H.C.H., d'Aldrine ou de Chlordane.

Clermont-Ferrand, le 20 Avril 1962.

Le Contrôleur Chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de Clermont-Ferrand
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

P41